

NOVO

puro como o amor pelo seu bebê

protege pele e cabelos delicados¹
desde o primeiro dia de vida



¹ Contra o ressecamento.

² Fonte Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care edição 2024, de acordo com as definições de marcas da categoria de produtos específicos para criança e bebê; todos os canais de varejo; vendas em valor a preços no ponto de venda; dados de 2023.



Neutrogena®

BEAUTY TO A SCIENCE

Hidratação profunda* com textura leve.

Fórmula clinicamente comprovada potencializada pelo poder do ácido hialurônico para uma pele irresistível.

*hidratação profunda na camada superficial da pele.

SempreLivre®

3X mais protegida*
com máximo** conforto

TECNOLOGIA
TRI
PROTECT

1

ABSORÇÃO
IMEDIATA

2

CANAIS DE
DISTRIBUIÇÃO
DO FLUXO

3

DUPLA
BARREIRA
ANTIVAZAMENTO

até
8h
de proteção
contra
vazamentos

até
12h
de proteção
contra
vazamentos



Fluxo moderado



23cm



Até fluxo muito intenso



28cm

*Considerando a tecnologia Tri Protect. **Dentro do portfólio de SEMPRE LIVRE®

TYLENOL®



Ação Rápida
15° min

TYLENOL

ALÍVIO RÁPIDO¹ DA DOR E FEBRE¹
SEGURO EM TODAS AS FASES DA VIDA¹

EXCLUSIVA TECNOLOGIA STAR POWER.®



TYLENOL® PARACETAMOL. TYLENOL®DC PARACETAMOL E CAFEÍNA. MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 576/2021. AFE Nº: 1.05.721-1. 1. BULA DO PRODUTO. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE DOR E FEBRE. ADVERTÊNCIAS: NÃO USE TYLENOL® JUNTO COM OUTROS MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM PARACETAMOL, COM ÁLCOOL OU EM CASO DE DOENÇAS GRAVE DO FÍGADO. TYLENOL®DC É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SAC 0800 728 6767 OU SERVIÇO AO PROFISSIONAL 0800 702 3522. DATA DE APROVAÇÃO: FEVEREIRO/2026. ©KENVUE BRASIL, 2026. *SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO*.

A GARGANTA
PEGOU?
PEGA UM



TRIPLO ATIVO CONTRA

DOR DE
GARGANTA



IRRITAÇÃO
NA
GARGANTA

TOSSE

BENALET® CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA, CLORETO DE AMÔNIO E CITRATO DE SÓDIO. INDICADO PARA O TRATAMENTO A DJUVANTE NOS QUADROS DE AFECÇÕES DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES. BENALET® É UM MEDICAMENTO. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS. MS – 1.5721.1204. SAC 0800 728 6767 OU SERVIÇO AO PROFISSIONAL 0800 702 3522. DATA DE PRODUÇÃO: FEV/26. ©JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA., 2026 *SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO* 1. BULA DO PRODUTO PARA O PACIENTE. *PRINCIPAL SINTOMA RELACIONADO A FARINGITE: DOR DE GARGANTA.

Novo



Antialérgico mais eficaz¹,³* e com
ação a partir de 20 minutos²*

*vs Fexofenadina 180 mg e Loratadina 10 mg

Age por ²



3x
mais rápido³,⁴*

**vs Loratadina 10 mg

REACTINE® DICLORIDRATO DE CETIRIZINA. INDICADO PARA O ALÍVIO DE SINTOMAS NASAIS E OCULARES DA RINITE ALÉRGICA SAZONAL E PERENE. ADVERTÊNCIAS: REACTINE® É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. MS – 1.5721.1212. SAC 0800 728 6767 OU SERVIÇO AO PROFISSIONAL 0800 702 3522. DATA DE APROVAÇÃO: FEVEREIRO/26. ©Kenvue Brasil – 2026. *SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO*. 1. Day J.H. et al, 2004 (cetirizina demonstrou redução de sintomas 33% maior no intervalo de 21 a 24 horas após a primeira dose). 2. Bula do produto. Δ o início de atividade ocorre dentro de 20 minutos em 50% dos indivíduos e dentro de uma hora em 95%. 3. Day J.H. et al., 2001 (cetirizina demonstrou superioridade na redução de sintomas no período entre 23 a 24 horas após a primeira dose).

Dobra as suas chances
de parar com
o hábito de fumar¹*

*Quando comparado ao não uso de reposição de nicotina.



nicorette®

NICORETTE® NICOTINA. INDICADO PARA ALIVIAR OS SINTOMAS DA SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA DE NICOTINA. ADVERTÊNCIAS: NÃO USE ESSE MEDICAMENTO SE VOGÊ É FUMANTE COM PROBLEMAS CARDÍACOS. MS – 1.5721.1210. SAC 0800 728 6767 OU SERVIÇO AO PROFISSIONAL 0800 702 3522. 1. BULA DO PRODUTO. DATA DE CRIAÇÃO: JANEIRO/2026. ©JNTL Consumer Health (Brazil) Ltda., 2025 SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. REFERÊNCIA: 1. Stead LF, Perera R, Bullen C, et al. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012.