

Dorflex®

Nº1



AGE NO FOCO DA SUA DOR



**Dor no
corpo
intensa**



**Dores
múltiplas***



**Dor de
cabeça e
enxaqueca**



**Dores
e febre**

*Dores associadas a contraturas musculares, incluindo dor de cabeça tensional. DORFLEX® / DORFLEX® MAX (dipirona monodratada, citrato de orfenadrina, cafeína anidra). Indicações: no alívio da dor associada a contraturas musculares, incluindo cefaleia tensional. MS: 1.8620.0008. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MEDICO DEVERA SER CONSULTADO. DORFLEX® UNO (dipirona monodratada). Indicações: analgésico e antitérmico. MS: 1.8620.0009. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MEDICO DEVERA SER CONSULTADO. DORFLEX® DIP (dipirona monodratada). Indicações: analgésico e antitérmico. MS: 1.8620.0006. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MEDICO DEVERA SER CONSULTADO. 1 - IQVIA FMB Valor CPP - AGO/2025 - Nº1 em vendas. MAT-BR-250413. 1.0 11/2025.

Empresa



Certificada

Constipação ao usar canetas emagrecedoras?*

DulcoLax®



*A Opella não vende, endossa ou promove nenhum medicamento agonistas GLP-1 específico. Consulte seu médico sobre o manejo adequado do seu tratamento. Referências: 1- Barrientos-Avalos JR et al. Gastrointestinal adverse effects of old and new antidiabetics: How do we deal with them in real life? Rev Gastroenterol Mex (Engl Ed). 2024 Oct-Dec;89(4):521-532. doi: 10.1016/j.rgmxen.2024.10.008. 2- Nicholas Hall Europe Limited - MAT 04 2024 value data in Nicholas Hall's global CHC. **DULCOLAX®** (bisacodil). Indicação: casos de constipação intestinal, no preparo para procedimentos diagnósticos, no pré e pós-operatório e em condições que exigem uma evacuação facilitada. MS 1.8620.0020. **O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS.** Leia atentamente a bula. **SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.** **DULCOLAX® GOTAS** (picossulfato de sódio). Indicação: para o tratamento da constipação e para facilitar a evacuação intestinal. MS 1.8620.0014. **O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS.** Leia atentamente a bula. **SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.** MAT-BR-2505680-1.0-01/2026.

Empresa

Certificada

Enterogermina®

RESTABELECE E EQUILIBRA A FLORA INTESTINAL*1

O probiótico que chega vivo ao intestino.



Escaneie para
saber mais



NOVO Enterogermina®
COM 5 FLACONETES
CABE NO BOLSO



Empresa

Certificada

*Uma flora intestinal equilibrada promove um ambiente desfavorável para bactérias patogênicas, promovendo a saúde intestinal. ENTEROGERMINA®. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Ref. 1 - Lopetuso L et al. Bacillus clausii and gut homeostasis: State of the art and future perspectives, Exp Rev Gastroenterol Hepatol 2016; 10(8):943-8; Paixão e Castro, 2016. 2. Senesi, S., et al., Molecular characterization and identification of Bacillus clausii Strains marketed for use in oral bacteriotherapy. Appl Environ Microbiol, 2001. 67(2): p. 834-9. 3. Ghelardi, E., et al., Survival and persistence of Bacillus clausii in the human gastrointestinal tract following oral administration as spore-based probiotic formulation. J Appl Microbiol, 2015. 119(2): p. 552-9. MAT-BR-2504056. SET/2025.



CONHEÇA

NOVALGINA EFERVESCENTE

Age rápido na dor.



*Início de ação entre 30 e 60 minutos. NOVALGINA® (dipirona monoidratada). Indicação: analgésico e antitérmico. MS 1.8620.0018. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MAT-BR-2503617. SET/25.

